

Bovaclox DC, (250 mg + 500 mg)/4,5 g



SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

1 tubostrzykawka (4,5 g) zawiera:

Kloksacylina (w postaci kloksacyliny benzatynowej) 500 mg

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na dowolną substancję pomocniczą.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <http://www.urpl.gov.pl> (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Bydło

do każdej ćwiartki wymienia. Lek podawać bezpośrednio po oczyszczeniu

Leczenie w okresie zasuszania: po ostatnim udoju w laktacji zawartość jednej tubostrzykawki należy wprowadzić przez kanał strzykowy do każdej ćwiartki wymienia.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

OKRESY KARENCJI

Tkanki jadalne - 28 dni.

Nie stosować u krów, u których występuje bardzo krótki okres zasuszania.

Nie stosować u krów mlecznych w okresie laktacji.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, JEŻELI KONIECZNE

Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Przed podaniem leku strzyk należy oczyścić i zdezynfekować.

Osoby o znanej nadwrażliwości powinny unikać kontaktu z produktem.

W razie kontaktu ze skórą należy zmyć ją wodą.

Jeśli w wyniku kontaktu z produktem pojawią się objawy, takie jak wysypka należy zwrócić się o pomoc lekarską i pokazać ulotkę lub opakowanie.

Produkt może być stosowany w okresie ciąży.

Produkt działa synergistycznie z cefalosporynami i aminoglikozydami.

o działaniu bakteriostatycznym (tetracykliny, makrolidy, chloramfenikol).

O sposoby usunięcia bezużytecznych leków zapytaj lekarza weterynarii.

23/07/2012

Tubostrzykawki pakowane są w blistry po 6 sztuk lub indywidualnie pakowane