

## ColoCeum Plus



### **Kup w naszym sklepie** ColoCeum Plus

#### **Mieszanka paszowa dietetyczna dla psów i kotów**

Smakowita pasta o kompleksowym składzie do stosowania w przebiegu ostrej biegunki i w okresie rekonwalescencji u psów i kotów

#### **Zastosowanie:**

Wspomagająco u zwierząt z biegunką o różnej przyczynie:

- infekcje wirusowe, bakteryjne, inwazja pasożytnicza
- nagła zmiana diety, alergia lub nietolerancja pokarmowa, zatrucie pokarmowe, toksyny
- antybiotykoterapia o szerokim spektrum, zaburzenia mikroflory jelit
- sytuacje stresowe lub wyczerpanie
- nieswoiste zapalenia jelit, enteropatie różnego pochodzenia

#### **Właściwości:**

Kombinacja pięciu aktywnych składników sprzyja ograniczeniu objawów biegunki i czasu jej trwania,

wspomaga regenerację i przywrócenie prawidłowej funkcji jelit:

- **montmorylonit/smektyt** - silny i skuteczny adsorbent, wiąże szkodliwe czynniki i toksyny, chroni i powleka śluzówkę
- **prebiotyki** - mannano-oligosacharydy (MOS) - stymuluje rozwój i pomagają przywrócić równowagę fizjologicznej mikroflory jelit
- **elektrolity** - sprzyjają przywróceniu równowagi wodno-elektrolitowej
- **dekstroza** - stanowi źródło łatwo przyswajalnej energii dla szybszego powrotu do zdrowia
- **L-glutamina** - zapewnia energię dla enterocytów, wspiera regenerację nabłonka jelit

#### **Sposób stosowania:**

Przed użyciem zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

Podawać doustnie według tabeli lub zalecenia lek.wet., zalecany czas stosowania 1-2 tygodnie. W łagodniejszych przypadkach może wystarczyć 3-dniowe podawanie pasty.

<b>Masa ciała</b>	<b>Rano</b>	<b>Wieczorem</b>
do 5 kg	1 ml	1 ml
6-15 kg	2 ml	2 ml
16-25 kg	3 ml	3 ml
26-35 kg	5 ml	5 ml
36-50 kg	7 ml	7 ml
ponad 50 kg	10 ml	10 ml

Jeśli jest konieczne podawanie pasty dłużej niż 3 dni, zwykle po trzecim dniu stosowania można zmniejszyć podawaną porcję o połowę.

Tłoczek strzykawki wyskalowany jest co 1ml. Odpowiednią ilość pasty odmierza się przekręcając pierścień na tłoku strzykawki. Następnie odmierzoną porcję wyciska się bezpośrednio do jamy ustnej zwierzęcia, w razie potrzeby można zmieszać z niewielką ilością karmy, upewniając się, że cała porcja zostanie zjedzona.

Należy zapewnić odpowiednią podaż płynów.

Opakowanie 15 ml - *jedno nacięcie tłoczka strzykawki odpowiada 1 ml*

Opakowanie 30 ml - *tłoczek strzykawki posiada zaznaczone podziałki*

Opakowanie 60 ml - *tłoczek strzykawki posiada zaznaczone podziałki*

**Skład:**

Gliceryna (glicerol), Dekstroza jednowodna, Melasa buraczana (z buraków cukrowych), Wyciąg z drożdży (źródło mannanooligosacharydów - MOS), Chlorek sodu, Chlorek potasu, Chlorek magnezu. **Dodatki:** 1g: Bentonit (montmorylonit) (1m558i) 400 mg/g, 3c Aminokwasy: L-glutamina (3c451) 2 mg/g, Konserwanty.

Składniki analityczne i poziomy: Węglowodany 38,03 g/100 g, Białko surowe 3,95 g/100 g, Włókno surowe 0,41% (w/w), Tłuszcz surowy <0,5%/100 g, Popiół surowy 0,9 g/100g, Zawartość wilgoci 57,1g/100g, Wartość kaloryczna 168 kcal/100g, Sód 1,8%, Potas 0,6%, Magnez 0,3%.

**Warunki przechowywania:**

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Wyłącznie dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Wytwórca i podmiot odp. za etykietowanie:**

CF Pharma Ltd, Unit 619b, Northern Extension, Waterford, Irlandia, WNI: αIEWD241387

**Dystrybutor:**

ScanVet Poland Sp. z o.o.

Skierszewo, ul. Kiszowska 9 62-200 Gniezno,

Tel. 61 426 49 20, WNI: PL3003182p

**Opakowania:**

15 ml, 30 ml, 60 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań mogą być dostępne w obrocie

<http://scanvet.pl/en/offer/owner-breeder/rid,113.html>